

Số: / BVTV - TTDVNN

Thanh Miện, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI VỤ MÙA NĂM 2024

(Từ ngày 07/8 đến ngày 14/8 năm 2024)

Kính gửi: - Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Dương;
- Thường trực huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành, UBND các xã, thị trấn;
- Các HTX dịch vụ nông nghiệp; Các đại lý buôn bán thuốc BVTV.

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết:

Từ giữa tháng 7 đến nay thời tiết liên tục có mưa, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 mưa liên tục trong 2 ngày từ 23-25/7 gây ngập úng một số diện tích. Từ đầu tháng 8 đến nay thời tiết có nắng, nóng. Nhiệt độ từ 34-37°C, ẩm độ từ 80-90%.

2. Cây trồng:

- Cây lúa: đang giai đoạn cuối đẻ nhánh. Trà mùa sớm đang giai đoạn phân hóa đòng;
- Ngô: đang giai đoạn trồng mới – 9 lá;
- Dưa, bầu bí: đang giai đoạn trồng - ra hoa, thu hoạch quả;
- Cây ăn quả: bưởi, cam chanh: quả nhỏ - thu hoạch;
- Rau các loại: trồng mới- phát triển thân, lá, thu hoạch.

II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 06/8/2024

1. Cây lúa:

- Chuột: Vẫn tiếp tục gây hại trên diện tích ven làng, gần đường đi, gần khu chuyển đổi, gần bãi rác, các khu ruộng cao, cận nước, các ruộng gieo vãi....
- Bệnh khô vằn: Bệnh bắt đầu gây hại tỷ lệ bệnh từ 3-5% dảnh, chỗ cao 10-15% dảnh, Cấp 1 –Cấp 3 tập trung các ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, các ruộng cây máy nhiều dảnh/khóm, cây to, chế độ nước không thường xuyên đặc biệt giai đoạn vừa qua bị ngập nước đến nay nước rút cộng với thời tiết nắng nóng làm thối lá nên bệnh khô vằn gây hại tăng hơn, tỷ lệ bệnh cao hơn.

2. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí:

- Bệnh giả sương mai: gây hại các ruộng dưa chuột giai đoạn ra hoa - thu hoạch.
- Bọ trĩ, bọ phấn: gây hại tăng trên các ruộng dưa mới trồng – ra hoa, đậu quả.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu: Gây hại ngô giai đoạn 3 lá – 9 lá;
- Bệnh gỉ sắt: sẽ gây hại ngô giai đoạn xoăn nõn- trổ cờ, phun râu;

III/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 14/8/2024

1. Cây lúa:

- Chuột: tiếp tục gây hại và cắn phá tăng và khó đánh bắt bằng biện pháp hóa học đặc biệt chuột sẽ phá hại mạnh trên trà lúa mùa sớm, các ruộng gieo vãi, cạn nước, gần khu chuyển đổi, bãi rác,...
- Bệnh khô vằn: gây hại tăng trên các trà, giống lúa đặc biệt các ruộng xanh tốt, cấy dày, bón thừa đạm, ...
- Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành đang vũ hóa rải rác và đẻ trứng trên trà mùa sớm;
- Sâu cuốn lá: Trưởng thành vũ hóa rải rác từ đầu tháng 8, mật độ thấp.

2. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí:

- Bệnh giả sương mai: tiếp tục gây hại tăng trên những ruộng dưa chuột giai đoạn ra hoa, đậu quả, thu hoạch.
- Bệnh bệnh héo vàng, héo xanh gây hại tăng do điều kiện thời tiết có mưa, ẩm độ không khí cao.
- Bọ phấn, bọ trĩ: gây hại tăng khi thời tiết nắng nóng, ít mưa tỷ lệ bệnh cao hơn trên dưa mới trồng gây rụng ngọt, chậm sinh trưởng.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu: gây hại ngô giai đoạn mới trồng – xoắn nõn;
- Bệnh gỉ sắt: gây hại ngô giai đoạn xoắn nõn – thu hoạch.

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Bệnh khô vằn:

Bệnh phát sinh gây hại tăng trên tất cả các trà, giống lúa và gây hại đến cuối vụ. Vì vậy các địa phương cần khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện bệnh đặc biệt các ruộng xanh tốt, các ruộng có chế độ nước không thường xuyên thường bị bệnh cao hơn. Khi thấy bệnh hại 10% dành trở lên thì tiến hành phun trừ ngay. Dùng các thuốc có hoạt chất Hexaconazol như: Anvil, Tiltvil, Jiavin,.....

2. Chuột:

Chuột sẽ tiếp gây hại tăng đặc biệt rất khó đánh bắt khi lúa đứng cái, làm đòng vì chuột sẽ ở trong ruộng cắn phá và ăn đòng lúa không ăn môi bả. Vì vậy các tổ diệt chuột cần tổ chức đánh bắt các đợt bổ sung cả bằng biện pháp hóa học và thủ công trước giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng. Đồng thời đây là giai đoạn sinh sản của chuột nên chuột cái làm các hang tạm ngay cạnh bờ máng, bụi rậm,... nên dùng các biện pháp thủ công như đào bắt, đặt cạm,... sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

3. Sâu keo mùa thu, sâu đục thân ngô:

- **Sâu keo mùa thu** gây hại mạnh khi cây ngô giai đoạn 3 – xoắn nõn ăn tước lá, mất ngọn ảnh hưởng đến sinh trưởng, mật độ cây. Đây là đối tượng sâu mới sức gây hại mạnh vì vậy bà con cần theo dõi và phun trừ kịp thời khi sâu tuổi nhỏ: dùng các thuốc như: Ammeri, Solo, Clever, Voliam Tango, Virtako,...

- **Sâu đục thân ngô:** gây hại giai đoạn cây ngô xoắn nõn – phun râu đặc biệt sâu gây đục vào bắp ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng bắp. Dùng các thuốc như: Ammeri, Voliam Tango, Virtako,....

4. Bệnh giả sương mai, dưa chuột, dưa lê:

-Bệnh sẽ gây hại tăng khi gặp điều kiện thời tiết có mưa, ẩm độ không khí cao, có gió. Cần phun phòng trừ bệnh đặc biệt là các ruộng đang ra hoa – đậu quả.
Dùng các thuốc như: Agronil, Ridomil Gold, Ricide, Aliette, Profiler,...phun lúc chiều mát.

Ngoài ra còn một số đối tượng gây hại trên rau màu, cây ăn quả như bọ nhảy, sâu xanh, sâu vẽ bùa, bệnh héo xanh,...các địa phương cần hướng dẫn nông dân phát hiện sowms và phun trừ kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Việt Thanh